

### ผลลัพธ์การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2566 มีการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม DUE มีการสั่งใช้ยา Piperacillin/tazobactam inj 19 ครั้ง และ Meropenem inj 108 ครั้ง

#### ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา

ยา	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการประเมินการใช้ยา	ร้อยละผู้ป่วยที่มีการสั่งใช้ยาไม่ตรงตามแนวทางการใช้ยาที่กำหนด	ร้อยละความสมบูรณ์ของการประเมินการสั่งใช้ยา
Piperacillin/tazobactam inj	73.68 (14/19)	0	92.86 (13/14)
Meropenem inj	87.96 (95/108)	0	84.21 (80/95)

#### ตารางที่ 2 รายละเอียดของความสมบูรณ์ของการประเมินการสั่งใช้ยา

ความสมบูรณ์ของการประเมินการสั่งใช้ยา	จำนวนครั้ง	
	Piperacillin/tazobactam inj	Meropenem inj
ไม่ได้ระบุ site of infection	-	6
ไม่ได้ระบุ indication	-	-
ไม่ได้ระบุการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	-	-
ไม่ได้ระบุ renal function	1	9
ไม่ได้ปรับยาตาม renal function	-	-

#### ตารางที่ 3 ผลลัพธ์การใช้ยาของผู้ป่วย

ยา	Status (ร้อยละ)			มูลค่าการใช้ยา
	Improved	Refer	Dead	
Piperacillin/tazobactam	84.21 (16/19)	15.79 (3/19)	-	43,690 (170 บ./vial)
Meropenem	65.74(71/108)	21.30 (23/108)	12.96 (14/108)	241,453 (135 บ./vial)